

INDICADORES DE SOSPECHA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA MUJER

Antecedentes de violencia

- Haber vivido otras relaciones de maltrato con la pareja.
- Haber sufrido o presenciado malos tratos en la infancia, abusos o agresiones sexuales.

Antecedentes personales

- Lesiones frecuentes.
- Problemas frecuentes como dolores, trastornos del sueño y de la alimentación.
- Abuso de psicofármacos, alcohol y otras drogas.

Síntomas físicos frecuentes

- Cefaleas, cervicalgias, dolor crónico generalizado.
- Mareos.
- Molestias gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, dispepsia y vómitos.
- Molestias pélvicas.
- Dificultad respiratoria.
- Sintomatología inespecífica.

Síntomas psicológicos frecuentes

- Insomnio, depresión, ansiedad, estrés postraumático.
- Intentos de suicidio.
- Agotamiento psíquico.
- Irritabilidad, labilidad emocional.
- Trastornos de la conducta alimentaria.

Utilización de los servicios de urgencias

- Alternancia de periodos de hiperfrecuentación con largas ausencias
- Incumplimiento de citas o tratamientos
- Frecuentes hospitalizaciones
- Acudir acompañada por la pareja cuando antes no lo hacía.

